

Gyógyszerallergia

A gyógyszerek alkalmazásakor sokszor találkozunk mellékhatásokkal, melyek között allergiás reakciók is előfordulnak.

Amikor először veszünk be egy gyógyszert, a testünk idegenként ismeri fel az anyagot, és ellenanyag-termelést indít meg. Ezek az IgE antitestek a gyógyszerrel való második érintkezés alkalmával hisztamint szabadítanak fel és kiváltják az allergiás reakciót.

Tünetek:

Enyhe bőrpírtól az anafilaxiás reakcióig széles skála fordul elő. Csalánkiütés, bőrvörösség, test és szemviszketés, zavartság, ajak és torokduzzanat –oedema is előfordul. Légzési nehezítettség, bőr lilás elszíneződése (oxigénhiány) szédülés, ájulás, idegesség, szapora szívverés, hányinger, hányás, hasmenés alakulhat ki.

Leggyakoribb gyógyszerallergiák:

Penicillin, szalicil, nyugtatók. Inzulin, jód.

Diagnózis:

Fontos a részletes kórelőzmény. Bőrteszttel lehet ellenőrizni, de kizárólag intézeti körülmények között, tekintettel a lehetséges anafilaxiás reakcióra.

Kezelés:

- A kimutatott gyógyszer kerülése.
- A tünetek csökkentése antihisztaminnal szteroiddal, adrenalinval és egyéb gyógyszerekkel.
- Gyógyszerallergiát kezelőorvosának feltétlenül jelezni kell.
- Mindig hordjon magával igazolványai között egy kártyát, melyre feljegyezték, hogy milyen gyógyszerre allergiás. Ez megmentheti az esetleges téves gyógyszereléstől, és életmentő lehet.